

がん化学療法レジメン登録内容

診療科レジメンコード	院内レジメン管理番号（受付番号）
HE003	060

がん種	レジメン名称（略語）						抗癌剤適応分類
急性リンパ性 白血病	Hyper-CVAD/MTX+Ara-C						<input type="checkbox"/> 進行・再発がん <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法 <input checked="" type="checkbox"/> その他
1コース期間 （次のコースまでの標準期間）		6 週		総コース数		4コース	
番号	抗癌剤名（商品名）	略号	1日投与量	投与法	投与時間	投与日（day）	
Hyper-CVAD							
1	シクロホスファミド	CPA	300×2 mg/m ²	DIV	3時間×2	1-3	
2	ビンクリスチン	VCR	2 mg/body	IV	slow iv	4,11	
3	ドキシルピシン	ADR	25 mg/m ²	DIV	24時間	4,5	
4	デキサメタゾン	DEX	40 mg/body	内服	毎食後	1-4,11-14	
5	メトトレキサート	MTX	12 mg/body	局所投与	髄注	2	
6	シタラビン	Ara-C	100 mg/body	局所投与	髄注	8	
MTX+Ara-C							
7	メトトレキサート	MTX	200 mg/m ²	DIV	2時間	22	
8	メトトレキサート	MTX	800 mg/m ²	DIV	22時間	22	
9	ソル・メドロール	mPSL	125×2 mg	DIV	3時間×2	23,24	
10	シタラビン	Ara-C	3×2 g/m ²	DIV	3時間×2	23,24	
11	メトトレキサート	MTX	12 mg/body	局所投与	髄注	23	
12	シタラビン	Ara-C	100 mg/body	局所投与	髄注	29	

※レジメンの特記事項

60歳以上：Hyper-CVADのVCRは1.0mg/m²（最大1.5mg/body）、MTX+Ara-Cのシタラビンは1g/m²
 Ph陽性例ではイマチニブ（グリヘック）400-600mgをday1-14、22-35に内服

お問い合わせ時は院内レジメン管理番号（受付番号）をお知らせください。

順天堂大学医学部附属練馬病院