

実施中の製造販売後調査 一覧

調査区分	診療科	医薬品・医療機器名等	対象疾患	オプトアウト
特定使用	脳神経内科	ソリス®点滴静注300mg	視神経脊髄炎スペクトラム障害（視神経脊髄炎を含む）	—
特定使用	糖尿病・ 内分泌内科	シグニフォール®LAR®筋注用キット	クッシング病	—
特定使用	膠原病リウマチ内科	リンヴォック®錠（登録のみ）	既存治療で効果不十分な関節リウマチ（関節の構造的損傷の防止を含む）	—
特定使用	血液内科	ジャガビ錠	真性多血症（既存治療が効果不十分又は不適当な場合に限る）	—
特定使用	腎・高血圧内科	パフセオ錠150mg、300mg	腎性貧血	—
特定使用	脳神経内科	ユプリズナ点滴静注100mg	視神経脊髄炎スペクトラム障害（視神経脊髄炎を含む）	—
特定使用	脳神経内科	メーセント錠	二次性進行型多発性硬化症	—
特定使用	膠原病・ リウマチ内科	ジセレカ錠200mg、100mg	関節リウマチ	—
使用成績	腎・高血圧内科	サムスカOD錠7.5mg、15mg、30mg	腎容積が既に増大しており、かつ、腎容積の増大速度が速い常染色体優性多発性のう胞腎	—
特定使用	腎・高血圧内科	エナロイ錠2mg エナロイ錠4mg	腎性貧血	—
使用成績	心臓血管外科	Alto腹部ステントグラフトシステム	腎動脈下腹部大動脈	—
特定使用	膠原病・ リウマチ内科	サフネロー点滴静注300mg	既存治療で効果不十分な全身性エリテマトーデス患者	—
使用成績	血液内科	アイクルシグ錠15mg	前治療薬に抵抗性又は不耐容の慢性骨髄性白血病、再発又は難治性のフィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性白血病	—
特定使用	小児科	ビムバット錠50mg、100mg、 ビムバットドロップ10%	強直間代発作（二次性に全般化した強直間代発作は除く）	—
使用成績	小児科	ビムバット点滴静注100mg	強直間代発作（二次性に全般化した強直間代発作は除く）	—
使用成績	眼科	パビースモ®硝子体内注射液 120mg/mL	中心窩下脈絡膜新生血管を伴う加齢黄斑変性（nAMD）、糖尿病黄斑浮腫（DME）	—
使用成績	心臓血管外科	アイノフロ吸入用800ppm	心臓手術の周術期における肺高血圧	—
特定使用	小児科	フィンテプラ内用液2.2mg/mL	他の抗てんかん薬で十分な効果が認められないDravet症候群患者におけるてんかん発作に対する抗てんかん薬との併用療法	—
特定使用	脳神経内科	ウィフガード®点滴静注400mg	全身型重症筋無力症（ステロイド剤又はステロイド剤以外の免疫抑制剤が十分に奏効しない場合に限る）	—
特定使用	消化器内科	ジセレカ錠200mg、100mg	潰瘍性大腸炎	—
特定使用	産科・婦人科	ゼジュラカプセル100mg ゼジュラ錠100mg	卵巣癌	—
使用成績	循環器内科	サムタス点滴静注用8mg	ループ利尿薬等の他の利尿薬で効果不十分な心不全における体液貯留	—
市場調査	循環器内科	リゾリトネキサコチラーセントシステム /22900BZX00186000 リゾリトネキサSVコチラーセントシステム /30100BZX00060000	【リゾリトネキサコチラーセントシステム】 対照血管径が2.5mmから4.2mmの範囲にあり、新規冠動脈病変（病変長35mm以下）を有する症候性虚血性心疾患 【リゾリトネキサSVコチラーセントシステム】 対照血管径が2.0～2.25mmの範囲にあり、血管形成術時に生じた血管解離又は急性若しくは切迫冠閉塞と判断される新規冠動脈病変（病変長27mm以下）を有する症候性虚血性心疾患患者の治療。	—
特定使用	脳神経内科	アムヴトラ®皮下注25mgシリンジ	トランスサイレチン型家族性アミロイドポリニューロパチー	—
特定使用	脳神経内科	エフビーOD錠2.5	パーキンソン病	—
使用成績	小児科	ボックスゾゴ®皮下注用0.4mg/0.56mg/1.2mg	軟骨無形成症	—
使用成績	血液内科	ベスレミ皮下注250µgシリンジ ベスレミ皮下注500µgシリンジ	真性多血症（既存治療が効果不十分又は不適当な場合に限る）	—
使用成績 比較調査	循環器内科	ペリキューボ錠2.5mg、ペリキューボ錠5mg、 ペリキューボ錠10mg	慢性心不全	—
特定使用	脳神経内科	レケンビ点滴静注200mg、レケンビ点滴静注500mg	アルツハイマー病による軽度認知障害及び軽度の認知症	—
特定使用	血液内科	エルレフィオ皮下注44mg/エルレフィオ皮下注76mg	再発又は難治性の多発性骨髄腫（標準的な治療が困難な場合に限る）	—
使用成績	呼吸器内科	アルンプリグ錠30mg、アルンプリグ錠90mg	非小細胞肺癌	—
特定使用	血液内科	ファビハルカプセル	発作性夜間ヘモグロビン尿症	—
使用成績	総合外科	ヒロイ®	CLDN18.2陽性の治癒切除不能な進行・再発の胃癌	—
使用成績	脳神経内科	ファダプス錠10mg	ランバート・イートン筋無力症候群	—
特定使用	皮膚科	リットフーロカプセル 50mg	円形脱毛症 （ただし、脱毛部位が広範囲に及ぶ難治の場合に限る）	—
特定使用	乳腺外科	トロデルビ®点滴静注用200mg	転移・再発トリプルネガティブ乳癌(mTNBC)	—
特定使用	脳神経内科	ユルトミス®点滴静注300mg、 ユルトミス®HI点滴静注300mg/3mL、 1100mg/11mL	視神経脊髄炎スペクトラム障害（視神経脊髄炎を含む）の再発予防	—
使用成績	脳神経内科	リステイーゴ皮下注280mg	全身型重症筋無力症（ステロイド剤又はステロイド剤以外の免疫抑制剤が十分に奏効しない場合に限る）	—