

6) 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率

- ・ 集計値は次の式で算出した値とする。
(分母のうち、手術開始前1時間以内に予防的抗菌薬が投与開始された手術件数 / 全身麻酔手術で、予防的抗菌薬投与が実施された手術件数) ×100
- ・ 式の分母及び分子で使用する値の抽出方法は次のとおり。
 1. 令和6年6月1日以降に入院し、令和6年6月1日から令和7年5月31日までの期間に退院患者であり、一般病棟に1回以上入院した患者を集計対象とする。ただし、入院後24時間以内に死亡した患者、生後1週間以内に死亡した新生児、臓器移植は集計対象外とする。
 2. 全身麻酔手術とは、当該手術実施時に使用していた麻酔の種類が以下2つのいずれかを含むものを指す。
硬膜外麻酔を併用した場合を含む。
L007：開放点滴式全身麻酔 L008：マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔

<注意点>

- ・ 当該項目は医療機関の性質ごとに異なるため、他医療機関の値との単純比較は困難である。
- ・ 分子が10件未満の場合は、分母、分子、割合の全ての項目で「－」を表示する。

全身麻酔手術で、予防的抗菌薬投与が実施された手術件数(分母)	分母のうち、手術開始前1時間以内に予防的抗菌薬が投与開始された手術件数(分子)	手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
2,460	2,451	99.63%