

1) リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率

・ 集計値は次の式で算出した値とする。

(分母のうち、肺血栓塞栓症の予防対策が実施された患者数 / 肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数) ×100

・ 式の分母及び分子で使用する値の抽出方法は次のとおり。

1.令和 7 年 6 月 1 日から令和 8 年 5 月 31 日までの退院患者であり、一般病棟に 1 回以上入院した患者を集計対象とする。ただし、入院後 24 時間以内に死亡した患者、生後 1 週間以内に死亡した新生児、臓器移植は集計対象外とする。

2.リスクレベルが「中」以上の手術は、「肺血栓塞栓症および深部静脈血栓症の診断，治療，予防に関するガイドライン（2017 年改訂版）」（日本循環器学会等）に準じて抽出。

3.これらの薬価基準コード及び薬価基準コードに対応したレセ電算コードを別表2、3、4に示す。別表3、4に記載のない薬剤であっても、別表2の薬価基準コードに該当する薬剤であれば集計に用いて構わない。

<注意点>

・ 分子が 10 件未満の場合は、分母、分子、割合の全ての項目で「－」を表示する。

肺血栓塞栓症発症の リスクレベルが「中」以上の 手術を施行した退院患者数(分母)	分母のうち、 肺血栓塞栓症の予防対策が 実施された患者数(分子)	リスクレベルが「中」以上の 手術を施行した患者の 肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
1,602	1,447	90.32%